



Disulfiram

Preparat stosowany w leczeniu alkoholizmu

Skład: 1 tabletkę wszczepiana podskórną zawiera: Disulfiram 100 mg

Właściwości i działanie

Disulfiram jest środkiem używanym w odwykowym leczeniu przewlekłego alkoholizmu. Hamuje przemiany alkoholu w wątrobie blokując dehydrogenazę aldehydu octowego, wskutek czego nie dochodzi do utlenienia tego aldehydu. W wyniku tego po spożyciu alkoholu leczony odczuwa dolegliwości psychiczne i somatyczne trwające aż do zakończenia przemian alkoholu w ustroju. Nasilenie ich zależy od ilości spożytego alkoholu. Dolegliwości obejmują: zaczerwienienie skóry, przyspieszenie częstości tętna i oddechu, bóle głowy, mdłości, wymioty, zaburzenia krążeniowe, uczucie osłabienia, dezorientację i przejściowe obniżenie ostrości wzroku. Dolegliwości te mają wywołać u alkoholika wstręt do picia alkoholu.

Podskórne wszczepienie leku umożliwia skuteczniejszą kontrolę leczenia niż podawanie disulfiramu doustnie.

Farmakokinetyka

Lek wchłania się stopniowo z miejsca podskórnego wszczepienia. Disulfiram ulega utlenieniu w wątrobie i wydalana się przez nerki.

Wskazania

Leczenie odwykowe w przypadkach przewlekłego alkoholizmu.

Dawkowanie

Co 2–3 miesiące wszczepia się podskórną 8–12 tabletek. Przy niewłaściwym wszczepianiu tabletki mogą się wysunąć nazewnątrz i w takim przypadku należy części tabletek ponownie wszczepić tak aby odpowiadały one jednej całej tabletkę.



Przeciwwskazania

Ciężka niewydolność sercowo-kръżeniowa, udary mózgowe, psychozy, ciąża.

Ostrożność jest konieczna w przypadkach niewydolności wątroby i nerek, cukrzycy, przewlekłym nieżycie oskrzeli i padaczce.

Działania uboczne

Uczucie zmęczenia, senność, zaburzenia żółtkowo-jelitowe, przykry zapach z ust, utrata popędu płciowego, alergiczne zmiany skórne.

Interakcje

Disulfiram wzmacnia działanie środków nasennych, środków do narkozy, glikozydów naparstnicy, leków p/zakrzepowych. Nie należy podawać leku razem z lekami przeciwpadaczkowymi. /Fenytolina, barbiturany/

Szczegółe zalecenia

Po wszczępieniu disulfiramum nawet małe ilości alkoholu mogą wywołać zahamowanie czynności oddechowej, napady drgawkowe, spadek ciśnienia i wstrząs. Dlatego w czasie leczenia konieczna jest całkowita abstynencja.

Opakowanie

12 tabletek

Producent

Pharmakon AG, Wallisellen, Szwajcaria

za zgodność: MINISTERSTWO
ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
ZATWIERDZA
dn. 20 sierpnia – 1988 r.

DYREKTOR
Departamentu Farmacji
mgr farm. Jerzy Zieliński